

La importancia de la carga en miembros superiores e inferiores en pacientes con Síndrome de Simpson-Golabi- Behmel: estudio de caso único

Virginia Espinosa Sánchez de Pablo¹ y Marta Gutiérrez Pérez¹

1. Centro Desarrollo Infantil Clínica Rubí. Almería. España.

Correspondencia:

Virginia Espinosa Sánchez de Pablo.
Centro Desarrollo Infantil Clínica Rubí. Almería.
España

Conflicto de Intereses:

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Este proyecto no ha sido presentado en ningún evento científico.

Financiación:

Los autores declaran no haber recibido financiación/compensación para el desarrollo de esta investigación.

DOI: 10.37382/jomts.v6i2.1565

Licensed under:

CC BY-NC-SA 4.0



Access the summary of the license
Access to legal code

RESUMEN

Introducción: el estudio se centra en un caso único diagnosticado de Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel, un trastorno genético raro que afecta múltiples aspectos del desarrollo físico.

Objetivos: demostrar la mejoría en la capacidad motora del paciente a través de un tratamiento de carga en miembros superiores e inferiores en su tratamiento de fisioterapia en Atención Temprana.

Métodos: se utilizó la Escala Gross Motor Function para evaluar al paciente en tres momentos distintos a lo largo de un período de 8 meses, documentando sistemáticamente los progresos obtenidos.

Resultados: PRIMERA EVALUACIÓN: El paciente presentaba hipotonía axial, control cefálico limitado y dificultades para mantener la carga en miembros superiores. No realizaba sedestación autónoma ni tenía habilidades de desplazamiento. SEGUNDA EVALUACIÓN: Hubo una evolución favorable, desarrollando un control cefálico más funcional y la capacidad de apoyarse sobre los antebrazos en prono, indicando un aumento en la carga de los miembros superiores. TERCERA EVALUACIÓN: Se observaron avances significativos; el paciente presentó control cefálico durante periodos prolongados, apoyó los miembros superiores con extensión de codo y comenzó a desplazarse mediante reptación. Logró la sedestación sin apoyo de miembros superiores e inició la bipedestación autónoma con apoyo anterior.

Conclusiones: la intervención fisioterapéutica con técnicas de carga y control postural resultó en mejoras significativas en el desarrollo motor del paciente, destacando la efectividad de la fisioterapia especializada en el tratamiento del Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel.