

Protocolo aplicación bleopuntura



Protocolo aplicación bleopuntura.

Es la aplicación de micropunturas o la infiltración intralesional a los papiloma virus o verrugas víricas rebeldes a otros tratamientos con bleomicina un polipéptido citostático.

Objetivos:

- La inhibición del ADN de tejido contaminado por el papiloma virus.
- Necrosis delimitada del tejido afecto por el papiloma virus.

Equipo:

- Bleomicina ® en polvo liofilizado.
- 10 cc. de agua destilada + anestésico local.

Material:

- Bisturí nº 15.
- Guantes estériles.
- Gasa estériles.
- Solución antiséptica de Clorexidina.
- Jeringa y aguja de insulina, donde está bien marcadas las décimas.
- Esparadrapo hipoalérgico.

Procedimiento:

- Información al paciente.
- Consentimiento informado.
- Preparación de la solución.
- Limpieza de la zona con solución antiséptica de clorexidina.

- Decapado de la hiperqueratosis existente sobre la verruga y su alrededor.
- Dejar expuestos los vasos trombosados.
- Practicar solamente las micropunciones sobre la verruga y dejar sangrar.
- Retirar la sangre de la pequeña hemorragia con una gasa haciendo un ligero raspado y decantar sobre la lesión 1 ó 2 microgotas (1'5 U).
- Repetir con la Bleomicina ® decantada en el lecho, las micropunciones.
- Dejar en reposo unos 30" y retirar restos.
- Tapar con un apósito de celulosa o gasa estéril.
- A los 10-15 días aparece una pequeña necrosis que puede retirarse con el decapado por planos con el bisturí.

Observaciones:

- Una vez preparada la solución de Bleomicina ®, puede almacenarse la restante en refrigeración un período máximo de 30 días.
- Tras la punción puede observarse un ligero edema perilesional.
- Si se practica la infiltración intralesional:
 - El edema es más acentuado, urticaria, enfermedad de Raynaud.
- Contraindicada en hipersensibilidad a la bleomicina, embarazadas, insuficiencia renal y tiene incompatibilidad con cisplatino, fenitoína, digoxina.